

LES INTERVENTIONS

LE PARAGE

Les méthodes de parage habituelles préconisent de sectionner la pointe de l'onglon puis de couper de chaque côté pour enlever l'excès de corne. Cette démarche présente le risque assez fréquent de faire saigner l'animal en coupant les vaisseaux qui irriguent le coussinet plantaire.

La pointe de l'onglon doit servir de repère pour placer le sécateur selon la forme anatomique du pied et couper en respectant le dessin de la ligne blanche.

Faire saigner un pied risque d'entraîner une infection et de déclencher la douleur. Les brebis sont alors plus vives, plus fatigantes à maintenir. La repousse de la corne sera plus anarchique et le parage plus rapidement indispensable.


LA TECHNIQUE DU PARAGE

Une prophylaxie efficace des problèmes de pattes chez les ovins passe d'abord par une bonne connaissance du pied et des incidents pouvant survenir. Elle demande ensuite des gestes assurés afin d'intervenir le plus efficacement possible.



A - Procéder en deux étapes

- Tailler à **plat** en faisant apparaître **toute** la ligne blanche. Enlever la corne morte (celle-ci se reconnaît à son aspect farineux).
- Enlever le pourtour de la ligne blanche en taillant perpendiculairement à la surface de la sole.



B – Le matériel à utiliser

Le parage s'effectue en toute tranquillité et sécurité si les outils sont de bonne qualité et bien entretenus.

On utilise :

- un sécateur courbé (type sécateur pour vendange) qui présente l'avantage d'épouser la forme de l'onglon ;
- un couteau de berger.



Aiguisage

L'aiguisage est correct lorsqu'on ne voit plus de zones de lumière sur le fil de la lame.

REMARQUE

Pour éviter des accidents avec ces outils tranchants, on peut prévoir des étuis. Il est préférable que ces étuis soient facilement accessibles : fixation à la ceinture ou à hauteur de travail.

C – Le parage curatif

Le parage curatif commence par une bonne identification des lésions. Toujours douloureux, il est souhaitable de l'effectuer avec efficacité et rapidité.

QUELQUES

REMARQUES

- 1 – En cas de fourchet ou de piétin, n'oubliez pas d'enlever les parties infectées qui se trouvent sur les **ergots** ;
- 2 – Le fourchet des bovins et des ovins est dû aux mêmes microbes (staphylocoques...), il faut donc traiter simultanément les deux espèces dans les exploitations mixtes ;
- 3 – Il existe des cas de fourbure chez les ovins. Ils sont liés à des déséquilibres alimentaires et exigent donc que la ration soit revue.

Attention à la position de la main.

Au moment de tailler l'onglon, veiller à ce que la main qui tient la patte n'appuie pas sur les **ergots**. Beaucoup de mouvements intempestifs de l'animal sont dus à cette inattention.

