



# Les critères d'appréciation de bonne santé

La prise de la température et l'examen de la paupière sont les premiers gestes à faire avant de poser un diagnostic et de réaliser un traitement.

## La prise de température

La première démarche à adopter face à un animal ou un lot d'animaux malades est la prise de température. La température normale est de 39 °C chez l'agneau s'il n'a pas couru et si la température ambiante est raisonnable et 38,5 °C chez l'adulte. Si cette dernière dépasse 40 °C, il y a infection. Si elle est inférieure à 36 °C, l'animal est en hypothermie. C'est une situation d'extrême urgence.



Prendre la température est la première chose à faire sur un animal malade.

### LA TEMPÉRATURE NORMALE :

- 39 °C chez un agneau
- 38,5 °C chez une brebis

## L'examen des muqueuses

Le second examen consiste à examiner les muqueuses à l'œil ou bien sur les gencives :

**1. À l'œil :** la couleur de la troisième paupière est en effet révélatrice de la bonne santé de l'animal. Pour faire ressortir cette troisième paupière, il suffit d'écarter les paupières et d'appuyer légèrement de part et d'autre de l'œil.



Si la troisième paupière est rose comme sur cette photo, tout va bien. Si elle est blanche, l'animal est anémié.



Si la troisième paupière est jaune comme sur cette photo, il s'agit d'un problème hépatique.



Si la troisième paupière est rouge comme sur cette photo, l'animal est soit en acidose, soit son état est grave.

**2. Sur la gencive :** on peut pratiquer le même examen en écartant les lèvres de la brebis ou de l'agneau et en regardant la couleur du bourrelet gingival.

Ici, le bourrelet est rose : tout va bien.



## Un problème de dent ?

Une mauvaise dentition peut être à l'origine d'un amaigrissement et d'un mauvais état général. Cet examen permet également de déterminer l'âge de la brebis. Les dents de lait sont en effet progressivement remplacées en commençant par les incisives. Les premières pinces adultes apparaissent vers l'âge d'un an. À 4 ans, les 8 dents de lait ont été remplacées. Au delà, les dents s'écartent, s'usent puis tombent. Une brebis dont il manque des dents doit être réformée.


Lors de l'examen, il ne faut pas oublier de regarder les molaires. Des défauts d'usure des dents peuvent entraîner des pointes dentaires qui blessent les joues et la langue et empêchent l'animal de manger. Il arrive aussi que des molaires tombent ce qui gêne considérablement la mastication. Pour regarder les molaires, il faut asseoir la brebis et glisser un doigt le long des dents tout en maintenant la bouche fermement fermée. Les morsures étant extrêmement douloureuses, l'immobilisation de la brebis doit être excellente. En cas de perte d'une dent on sentira un trou, en cas de pointe dentaire, on sentira des irrégularités avec une dent qui fait nettement saillie dans la joue.




Ici, il manque une dent et les autres se sont écartées car elles commencent à s'user : cette brebis est à réformer.

## Reconnaître l'âge de la brebis avec sa dentition


**à 3 mois :**  
uniquement les dents de lait



**à 1 an :**  
apparition des pinces adultes



**à 2 ans :**  
apparition des premières moyennes adultes



**à 3 ans :**  
apparition des secondes moyennes adultes



**à 4 ans :**  
apparition des coins adultes



Fiche réalisée grâce à l'aimable participation de Delphine Daniel, vétérinaire formatrice.

Pour en savoir plus  
[www.reconquete-ovine.fr](http://www.reconquete-ovine.fr)

### POUR EN SAVOIR PLUS :

- Laurence Sagot et Eric Pottier : CIIRPO / Institut de l'Élevage  
Tél. : 05 55 00 40 37 ou [laurence.sagot@idele.fr](mailto:laurence.sagot@idele.fr)
- Sites internet :  
[www.reconquete-ovine.fr](http://www.reconquete-ovine.fr) / [www.idele.fr](http://www.idele.fr)

11/2011. Document réalisé avec le soutien financier de :

