Support d'audit pour un diagnostic sur la mortalité des agneaux

ÉLEVAGE

Nom : .....

Adresse : .....

N° EDE : .....

Signature

TECHNICIEN

Date du diagnostic : .....

Nom : .....

Structure : .....

Signature

PÉRIODE D'AGNELAGE PRISE EN COMPTE DANS L'ANALYSE

Du ..... au .....

- Nombre de brebis ayant mis bas : .....
- % de primipares : .....
- % de brebis de + de 6 ans : .....
- Taux de prolificité : .....
- Lot en système accéléré : OUI ☐ - NON ☐

ANALYSE DES RÉSULTATS DE MORTALITÉ DES AGNEAUX

- Nombre d'agneaux nés : .....
- Nombre d'agneaux morts : .....
- Taux de mortalité global : .....
- Taux de mortalité à 60 jours : .....
- Mortalité par classe d'âge :
  - Avorton et mort-né : .....
  - De 0 à 48 heures : .....
  - De 2 à 10 jours : .....
  - À + de 10 jours : .....
- Les trois principales causes de mortalité observées par l'éleveur :
  - Cause 1 : .....
  - Cause 2 : .....
  - Cause 3 : .....

SYNTHÈSE DE L'ANALYSE DES RÉSULTATS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MARGES DE PROGRÈS (indicateurs de suivi)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RECONQUÊTE OVINE — Le CIIRPO — INSTITUT DE L'ELEVAGE — INP ECOLE NATIONALE VETERINAIRE — UMT Santé Petits Ruminants

Du diagnostic aux moyens d'action

GESTION SANITAIRE DES BREBIS	SATISFAISANT OUI	SATISFAISANT NON
Politique de réforme	☐	☐
Statut parasitaire des brebis	☐	☐
Vaccination des brebis contre :		
Respect du protocole vaccinal	☐	☐

COMMENTAIRES ET CONSEILS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GESTION DES BREBIS EN FIN DE GESTATION	SATISFAISANT OUI	SATISFAISANT NON
NEC* moyenne à la mise bas : (Recommandation : entre 2,8 et 3,5)	☐	☐
Homogénéité de la NEC* à la mise bas (Recommandation : - de 15 % < 2, et - de 15 % > 4)	☐	☐
Évolution de la NEC* entre milieu de gestation et la mise bas	☐	☐
Rations adaptées (Recommandation : brebis triées selon la NEC ou la taille de la portée)	☐	☐
Intervention et/ou incident	☐	☐
Statut minéral et vitaminique	☐	☐
Carence en :		

COMMENTAIRES ET CONSEILS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

* NEC = Note d'État Corporel

Des documents techniques à votre disposition

GESTION DE L'AGNELAGE	SATISFAISANT OUI	SATISFAISANT NON
Taille des « sous-lots » d'agnelage (Recommandation : - de 80 brebis/UMO sur synchronisation des chaleurs, et - de 200 brebis/UMO sur lutte naturelle)	☐	☐
Brebis allaitantes séparées des gestantes	☐	☐
Présence au pic d'agnelage	☐	☐
Surveillance de l'agnelage	☐	☐
Vérification de la mamelle	☐	☐
CASES D'AGNELAGE		
Passage en cases d'agnelage (Recommandation : systématique pour les primipares et les portées doubles et plus)	☐	☐
Durée en case d'agnelage (Recommandation : 24 heures minimum, 12 heures exceptionnellement)	☐	☐
Surface des cases d'agnelage (Recommandation : 1,5 m² minimum)	☐	☐
Paillage entre chaque brebis	☐	☐
Fréquence de paillage	☐	☐
Eau à disposition	☐	☐

COMMENTAIRES ET CONSEILS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BERGERIE	SATISFAISANT OUI	SATISFAISANT NON
Entretien bergerie avant mises-bas	☐	☐
Surface aire paillée par brebis avec agneaux (Recommandation : 1,5 m² mini. par brebis avec 1 agneau, et 2 m² mini. par brebis avec portée de 2 et +)	☐	☐
Fréquence de paillage (Recommandation : tous les jours pendant l'agnelage)	☐	☐
Quantité de paille (Recommandation : 1 kg/brebis/jour)	☐	☐
Ambiance des bergeries	☐	☐
Courant d'air	☐	☐
Abris pour agnelage au pâturage	☐	☐
Différence d'âge entre agneaux (Recommandation : moins d'une semaine)	☐	☐

COMMENTAIRES ET CONSEILS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Suite du diagnostic au dos

SOINS AUX AGNEAUX

		SATISFAISANT OUI	SATISFAISANT NON
Vérification de la prise colostrale (Recommandation : dans les 4 heures après la naissance)	systématique	☐	☐
	rapidité	☐	☐
	modalité	☐	☐
Utilisation de colostrum en cas de besoin		☐	☐
Désinfection du nombril (Recommandation : dans les 12 heures après la naissance)	systématique	☐	☐
	rapidité	☐	☐
	modalité	☐	☐
Pose des boucles sur agneaux secs		☐	☐
Hygiène à la pose des boucles		☐	☐
Hygiène lors de la caudectomie		☐	☐
Vaccination des agneaux contre :			
Respect du protocole vaccinal		☐	☐
Soins aux agneaux malades		☐	☐

COMMENTAIRES ET CONSEILS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GESTION DE L'ALLAITEMENT ARTIFICIEL (AA)

	SATISFAISANT OUI	SATISFAISANT NON
% d'agneaux à l'AA exclusif		
Prise colostrale (Recommandation : systématique avant mise à l'AA)	☐	☐
Différence d'âge à l'AA (Recommandation : moins d'une semaine)	☐	☐
Dispositif de protection thermique	☐	☐
T° de reconstitution du lait artificiel	☐	☐
Concentration du lait artificiel	☐	☐
Hygiène du matériel servant à l'AA (Recommandation : désinfection quotidienne et nettoyage à chaque utilisation)	☐	☐

COMMENTAIRES ET CONSEILS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

+ d'infos en ligne :
http://umt-sante-petits-ruminants.idele.fr
www.reconquete-ovine.fr

UMT Santé Petits Ruminants

Ce document a été réalisé grâce aux soutiens techniques et financiers de :

association régionale ovine du Limousin
Agricultures & Territoires Chambre d'agriculture Auvergne
Liberté • Égalité • Fraternité République Française — Opération soutenue par l'État Fonds national d'aménagement et de développement du territoire
FranceAgriMer
DATAR Massif central
Région Limousin
Auvergne la région juste et grande
la Région Languedoc Roussillon

N° PUB : 001339057 - ISBN : 978-2-36343-479-1 Conception : Rtech