

# LES AGNEAUX DE BERGERIE APRÈS LE SEVRAGE

**Après le sevrage, l'alimentation, le sanitaire et le logement conditionnent les performances des agneaux.**

**GÉNÉRALITÉS**

**TRANSITION ALIMENTAIRE OBLIGATOIRE :**

Une transition alimentaire doit obligatoirement accompagner les changements d'alimentation sous peine de perturbations digestives. Dans tous les cas, un allongement de la durée de finition d'une à quatre semaines selon la nature du changement est à prévoir.

**QUELQUES REPÈRES SUR L'ÂGE À LA COMMERCIALISATION :**

- ▶ **À 90 JOURS**  
Les premiers agneaux sont commercialisés
- ▶ **À 120 JOURS**  
Plus de la moitié des agneaux est vendue
- ▶ **À 150 JOURS**  
Tous les agneaux (ou presque) sont commercialisés

**◀ L'ALIMENTATION**

Aliments complets et mélanges fermiers sont utilisés pour la finition des agneaux en bergerie. Leurs valeurs alimentaires doivent être comprises entre 0,85 et 1,1 UF et 110 à 120 g de PDI ou bien entre 16,5 et 17,5 % de MAT sur la matière brute (valeurs en cours de révision). Le mélange fermier reste plus acidogène, en particulier lorsque la proportion de céréale est élevée. S'il s'agit d'un méteil, il est indispensable d'évaluer sa valeur alimentaire (fiche technique à disposition sur nos sites).

L'aliment peut être distribué à volonté ou bien rationné quotidiennement. Les quantités conseillées varient de 0,8 à 1,2 kg par agneau et par jour selon le sexe. Une seule distribution quotidienne est alors envisageable si les agneaux sont habitués à consommer l'aliment. Un niveau de rationnement plus sévère pénalise davantage les croissances et entraîne un allongement de la durée de finition de plus de deux semaines.

Un fourrage grossier, de type paille ou foin de graminées de première coupe est bien adapté aux agneaux disposant de concentré à volonté ou bien rationné dans les proportions indiquées ci-dessus. Avec du foin de légumineuses pures, l'apport d'une céréale peut suffire.

**COMBIEN MANGE UN AGNEAU ?**

- **Au quotidien : un agneau de 30 à 35 kg consomme entre 1 et 1,5 kg d'un aliment classique (0,9 UFV) et environ 200 g de paille par jour.**
- **Au total : compter 70 à 80 kg brut d'aliment concentré et 20 kg de paille pour un agneau de bergerie.**



© Photo: CIRPO



Une fiche technique sur la valeur alimentaire du méteil est disponible sur [www.inn-ovin.fr](http://www.inn-ovin.fr) et [www.idele.fr](http://www.idele.fr)



## ◀ LE SANITAIRE

Après le sevrage, les agneaux sont particulièrement sensibles à deux types de pathologies, d'ordres respiratoires et digestifs. Dans le premier cas, un défaut de ventilation de la bergerie est un facteur favorisant qui peut être corrigé après un diagnostic d'ambiance. Dans le second cas, un accès insuffisant au concentré ou au fourrage peut être à l'origine d'acidose et d'entérototoxicité. Des vaccins existent pour prévenir ces maladies. L'incorporation de chlorure d'ammonium afin de limiter les lithiases urinaires (appelées également gravelles) est de nouveau autorisée dans les aliments pour agneaux. Sa présence est obligatoirement notée dans les additifs de l'aliment sur le bon de livraison. Attention, l'utilisation de bicarbonate de soude annihile en partie ses effets.

### **ET SI LES AGNEAUX SONT MALADES**

- Prenez la température des agneaux malades.
- Faites faire des analyses de crottes sur les agneaux.
- Faites faire une autopsie.
- Pour en savoir plus, consultez votre vétérinaire.



## ◀ LE LOGEMENT

Dans la bergerie, la pression microbienne et la capacité de résistance des agneaux sont liées à l'ambiance du bâtiment et à l'hygiène qui lui est apportée. Dans ce domaine, le paillage est un élément clef et il est conseillé de pailler tous les deux à trois jours. D'autre part, les bergeries doivent être ventilées et pas complètement fermées, les courants d'air étant à l'origine de troubles respiratoires.

Les recommandations en matière de logement sont les suivantes :

- surface d'aire paillée : 2 agneaux au m<sup>2</sup> maximum,
- nourrisseur rectangulaire : 12 agneaux au mètre pour les agneaux à volonté et 4 agneaux au mètre pour les agneaux rationnés (nous ne disposons pas de recommandation pour les nourrisseurs circulaires),
- râtelier : 8 à 10 agneaux au mètre linéaire,
- abreuvoir : un abreuvoir pour 50 agneaux posé à 40 cm du sol avec une marche par exemple pour que les plus petits agneaux puissent l'atteindre,
- vitesse de l'air inférieure à 0,25 m/s soit 0,9 km/h.

### **LE DIAGNOSTIC D'AMBIANCE**

Compter de 300 à 500 € pour les différentes mesures et les conseils d'amélioration de la ventilation de la bergerie.

## ▶ POUR EN SAVOIR PLUS :

[www.inn-ovin.fr](http://www.inn-ovin.fr) et [www.idele.fr](http://www.idele.fr)

Découvrez nos fiches techniques, vidéos, podcasts et diaporamas