

## LES AGNEAUX DE BERGERIE AVANT LE SEVRAGE

**Les performances des agneaux avant le sevrage dépendent en premier lieu des quantités de lait dont ils disposent. Des brebis avec une bonne valeur laitière et en bon état à la mise bas restent la principale garantie de réussite d'un lot d'agneaux.**

### DES PRÉ-REQUIS

#### LE LAIT MATERNEL, ALIMENT INDISPENSABLE :

Aucun aliment, qu'il s'agisse de fourrage ou de concentré ne peut compenser totalement un manque de lait. Les quantités totales de concentré consommées par un agneau sont directement liées à la production laitière de sa mère.

#### UNE VALORISATION DES ALIMENTS APRÈS 5 SEMAINES :

Dès l'âge de 15 jours, l'agneau est capable de consommer du fourrage et du concentré, mais en très faible quantité. À partir de 5 semaines, il peut éventuellement être sevré et valoriser les aliments secs.



© Photo: CIRPO

### ◀ L'ALIMENTATION

Le lait constitue l'essentiel de la ration d'un agneau et le concentré joue un rôle secondaire. L'aliment destiné à la finition des agneaux peut être mis à disposition à partir de 15 jours d'âge. Il est alors distribué en faible quantité et renouvelé deux fois par semaine pour rester appétant. En dehors de raisons sanitaires, l'utilisation d'un aliment démarrage (appelé également starter) ne présente pas d'intérêt. Si la ration de base des brebis est constituée de fourrages humides (ensilage, enrubbage), la limitation de l'accès au fourrage des jeunes agneaux (fermeture dans le parc à agneaux) est alors une solution pour limiter les problèmes digestifs.

### QUALITÉ DE L'EAU

*Les agneaux sont plus sensibles à la qualité bactériologique de l'eau que les brebis. Si un problème de qualité d'eau est suspecté, il peut être utile de faire une analyse d'eau. Compter 60 à 70 € avec une bactériologie simple. L'interprétation des résultats d'analyses doit être confiée à un spécialiste.*

### ◀ LE SANITAIRE

Les principales maladies du jeune agneau, en majorité infectieuses et de natures respiratoires, digestives et articulaires, peuvent se prévenir. Les conditions d'hygiène lors de l'agnelage et les soins préventifs sur les agneaux (désinfection cordon et boucle, surveillance de la prise de colostrum) sont des points primordiaux pour limiter l'apparition de ces pathologies. Si de jeunes agneaux à partir d'un mois d'âge présentent une diarrhée verdâtre ou noirâtre, qu'ils ont une laine « piquée » (sèche et hirsute), et qu'ils se lèchent le ventre donnant à la laine un aspect marbré, la coccidiose peut être suspectée, souvent aggravée par une infestation par les strongyloïdes.

### ET SI LES AGNEAUX SONT MALADES

- Prenez la température des agneaux malades.
- Faites faire des analyses de crottes sur les agneaux.
- Faites faire une autopsie.
- Pour en savoir plus, consultez votre vétérinaire.



© Photo: CIRPO

## ◀ LE LOGEMENT

La tranche idéale de température dans la bergerie se situe entre 10 et 15 °C mais les agneaux de plus de 10 jours sont robustes et supportent mieux les températures plus basses que les nouveaux nés. Une ambiance sèche sans courant d'air limite les effets des écarts de température qui sont alors mieux supportés par les agneaux. Des animaux groupés, dormant toujours au même endroit, des animaux nerveux lors de changement de temps sont des signes de présence de microclimats néfastes dans la bergerie. D'autre part, les recommandations sont de 1,5 m<sup>2</sup> minimum d'aire paillée par brebis allaitant un seul agneau et 2 m<sup>2</sup> minimum par brebis allaitant deux agneaux, surfaces du parc à agneaux comprises. Un paillage quotidien s'impose, en particulier si les brebis disposent d'une ration humide. Avec une ration sèche, il est impératif de pailler tous les deux jours au minimum afin de conserver une litière propre sauf si la densité d'animaux est nettement inférieure aux seuils indiqués ci-dessus. Compter 700 à 1 kg de paille pour le paillage par brebis et par jour soit 500 à 700 g au m<sup>2</sup>. Enfin les maladies sont très liées à l'âge de l'agneau et le fait de constituer des lots d'agneaux de même âge, c'est-à-dire de moins de 15 jours de différence d'âge, permet de mieux gérer les risques et ainsi de diminuer le taux de mortalité.

### **LE DIAGNOSTIC D'AMBIANCE**

*Compter de 300 à 500 € pour les différentes mesures et les conseils d'amélioration de la ventilation de la bergerie.*

## ◀ LE SEVRAGE

Les agneaux allaités en bergerie sont généralement sevrés entre 60 et 90 jours. Un sevrage à 60 jours se justifie dans les systèmes accélérés avec une remise en lutte rapide des mères. Dans les autres cas, on a intérêt à profiter au maximum du lait des mères. Un sevrage lors de la première vente, c'est-à-dire entre 80 et 90 jours est alors classique. Nous ne disposons pas de résultats d'essais récents sur les effets d'une absence de sevrage sur les qualités de carcasse et les indices de consommation.

## ▶ POUR EN SAVOIR PLUS :

[www.inn-ovin.fr](http://www.inn-ovin.fr) et [www.idele.fr](http://www.idele.fr)

Découvrez nos fiches techniques, vidéos, podcasts et diaporamas

© Photo : CIIRPO



© Photo : CIIRPO

