

Au fil des Saisons

L'actualité du Ciiirpo :

Adressée par mail à tous les membres du Ciiirpo, cette lettre bimensuelle vous informe des activités de recherche et de diffusion en cours au Mourier et sur les sites associés.


N°168

4 mai 2018

La situation climatique

Au Mourier, le mois d'avril cumule 129 mm dont 63 le week-end dernier. Sur les 4 premiers mois de l'année, ce sont 455 mm de pluie qui sont comptabilisés au total. D'autre part, la température moyenne est douce avec 11,6 °C même si -2°C ont été enregistrés hier au petit matin. Les conditions climatiques sont ainsi très favorables à la pousse de l'herbe.


Pluviométrie et température mensuelles au Mourier



L'évolution des disponibilités en herbe

En deux semaines, la hauteur d'herbe moyenne a fait un bond de près de 4 cm pour atteindre 9,7 cm, soit près de 2 cm de plus qu'en 2017 à la même date. Désormais, seulement 0,6 cm d'herbe sépare les deux modes de pâturage, tournant et cellulaire, toujours en faveur du premier.

Evolution de la hauteur d'herbe (cm herbomètre) sur les surfaces pâturées



Les événements de la semaine

- A l'EPLEFPA de Moulins, les dernières mesures sur l'essai bois litière pour les agneaux sont réalisées ce jour,
- Au Mourier, l'équipe qui réunit les sites qui vont participer aux essais sur le pâturage des surfaces additionnelles (vergers, vignes, céréales) se réunit aujourd'hui pour bâtir les protocoles de suivi,
- Au Mourier, c'est aujourd'hui la dernière journée de tonte avant celle des agneaux et agnelles cet été.



L'équipe « surfaces additionnelles »



La fin de la tonte



Les brebis en pâturage cellulaire

Nos rendez-vous

- Synthèse des essais « pâturage cellulaire » le 5 mai à Montmorillon (86)

- les Rencontres du CIIRPO pour les techniciens le 19 juin au Mourier

La nouveauté de la semaine

(en pièce jointe)

Le CIIRPO
CENTRE INTERRÉGIONAL D'INFORMATION ET DE RECHERCHE EN PRODUCTION OVINE

LA LETTRE TECHNIQUE DES ÉLEVEURS OVINS | N° 32 - mai 2018

Un haras de béliers bichonné !

Pour assurer de bons taux de fertilité et de prolificité avec des durées de lutte courtes, les béliers doivent être en pleine forme et suffisamment nombreux.

Mode d'emploi du jeune bélier acheté

Vous venez d'acheter un bélier qualifié dans une station de contrôle individuel, un centre d'élevage, une étable à béliers ou bien directement chez un sélectionneur. Une quarantaine et une transition alimentaire sont indispensables pour lui laisser le temps de s'adapter à son nouveau milieu. Dans le cas contraire, la perte de poids peut être très importante et compromettre son avenir.

Deux cas de figures se présentent :

- Si c'est un agneau : il est âgé de 6 à 8 mois. Son alimentation a surtout été à base de concentré. Pour réaliser une transition alimentaire, continuez à lui distribuer 300 g de concentré par jour et diminuez progressivement si il est à l'herbe.
- Si c'est un animal si il est âgé de 12 à 15 mois. Pour certaines races, il était à l'herbe et complétement avec du concentré, de l'ordre de 300 g par jour. Il faut donc continuer à lui donner du concentré au cours de la période de quarantaine et diminuer progressivement.

Dans tous les cas, la plus grande vigilance s'impose en matière de parasitisme interne (strongyles, ténias) quels que soient l'âge et le poids des jeunes béliers.

Enfin, le mélange avec les béliers de l'élevage peut s'avérer délicat. Afin que la hiérarchie s'établisse entre les « anciens » et les jeunes lors du mélange, il est conseillé de les mettre dans un espace restreint en bergerie.



DES RÈGLES POUR RÉPARTIR SES BÉLIERS AU MIEUX DANS LES LOTS DE LUTTE

Âge des béliers	Destination
Agneau de moins d'un an	Ne pas mettre en lutte (en croissance)
Adolescent : un à deux ans	Béliers adultes en priorité
Adulte : 3 à 5 ans	Agnelles ou brebis adultes
Plus de 5 ans	Vente pour la réforme

C'EST BON À SAVOIR

- Pour assurer le renouvellement, 25 % de haras est acheté chaque année en jeunes béliers.
- Prévoir un ou deux béliers de plus que nécessaire pour les besoins, un bélier malade (bubale, diarrée...) ne peut pas assurer de bons résultats de reproduction.



ON LE DIT !

Prévoir un nombre de béliers engagé dans un lot de lutte : pendant que deux se battent, la troisième s'occupe des brebis !