



# QUELS DÉBOUCHÉS POUR LES AGNEAUX ?

**En AURA** : 9929 tec d'agneaux produites : 41% sont abattues sur le territoire correspondant à 24% de la consommation régionale (2016)

## ✓ Différents circuits de commercialisation des agneaux

Organisations de producteurs commerciales et non commerciales



Négociants et marchés aux bestiaux

Circuits courts : boucherie et vente directe

## ✓ Valoriser ses agneaux dans une démarche de qualité

S'engager à respecter un cahier des charges, c'est aussi une garantie pour mieux valoriser économiquement ses agneaux !

- **SIQO** : Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine (Label rouge, IGP, AB) → 18% des agneaux produits en région



- **CCP EQC** 
- **Marques commerciales** (Volcagno, Terroirs du sud, etc.)

## ✓ Produire un agneau correspond au choix de commercialisation et à son système de production

- **Agneau d'herbe** : né de février à mai, abattu entre 3,5 et 7 mois à un poids de 17 à 22 kg
- **Agneau gris ou de report** : agneau d'herbe vendu entre 7 et 10 mois
- **Agneau de bergerie** : abattu entre 3 et 4,5 mois à un poids de 16 à 22 kg
- **Agneau léger** : abattu entre 2 et 3 mois à un poids de 24 à 30 kg vif



# LES 6 DERNIÈRES SEMAINES DE GESTATION : UNE PHASE CLÉ

- **Les besoins augmentent** (de 0.8 à 1.4 UFL et de 61 à 172 g de PDI)  
Les agneaux prennent les 2/3 de leur poids de naissance 6 semaines avant la mise bas.
- **Ne pas puiser dans les réserves corporelles des mères**
- **Trier et alloter les mères de simples et de doubles → le lait est le premier aliment de l'agneau!**  
Complémenter avec des céréales + complémentaire azoté

*Exemple de ration par jour pour les brebis en fin de gestation (Prolificité > à 150%) :*

	3 à 6 semaines avant mise bas	3 semaines avant mise bas
Enrubannage de graminées	1 kg MS	1 kg MS
Foin de graminées	À volonté	A volonté
Céréale	400 g brut	600 g brut
Tourteau de colza	0 g brut	200 g brut
CMV de type 7/21	20 g brut	30 g brut



**300 g en moins de concentrés pour les mères de double : c'est 700 g de poids en moins à la naissance par agneau et 6% mortalité en plus !**

**En pratique : 1 kg de poids de naissance en moins = 1 kg de carcasse en moins à la vente**





# LES 6 DERNIÈRES SEMAINES DE GESTATION : UNE PHASE CLÉ

## ✓ Constitution d'un parc à agneau

- A partir de 5 à 15 jours d'âge
- Lot d'agneau homogène du même âge
- Mise à disposition d'aliment et d'argile
- Accès à l'eau (abreuvoir fixé à 30 cm de haut)
- **Surface recommandée** : 5 agneaux au m<sup>2</sup> pour des agneaux de 3 semaines puis de 3 à 4 agneaux au m<sup>2</sup> jusqu'à 2 mois.
- **Une séparation des agneaux des mères** (intérêt notamment dans le cas d'une distribution de ration humide)

## ✓ Repères de consommation de concentré et de fourrage de la naissance à l'abattage

Objectifs	Concentré en kg	Fourrage en kg MS
Agneau mâle en bergerie	75 à 85	30
Agneau femelle en bergerie	65 à 75	25
Agneau léger	25 à 35	15

Source : référentiel technico-éco 2019, Inosys Réseau d'élevage Auvergne-Rhône-Alpes



Pour en savoir plus : [www.inn-ovin.fr](http://www.inn-ovin.fr)



# ALIMENT IDEAL POUR LES AGNEAUX APRÈS SEVRAGE

- ✓ Sevrage entre 70 et 90 jours (tout dépend de l'accélération de la reproduction)
  - ✓ Séparer les males des femelles au sevrage
  - ✓ Concentrés : aliment du commerce ou mélange fermier
- ➔ respecter un mélange qui titre à 0,85 à 1,1 UFV et 100 g PDI par kg brut

	Mélange fermier
Céréales ou maïs	Triticale, orge, seigle, blé (maximum 40% de la ration totale) et avoine (maximum 25 % de la ration totale)
Matière azotée	Complémentaire azoté, tourteau de colza, pois et féverole, foin de luzerne
Complément minéral	Type 0-20 avec chlorure d'ammonium (sauf AB)

Gain de 4 à 6 € par agneau par rapport aliment du commerce (hors stockage)  
Travail en plus  
10 à 15 jours de plus de finition

- ✓ Modes de distribution du concentré : à volonté ou rationné ?

### En rationné :

- allongement de la durée de finition de 2 à 3 semaines
- quantité de fourrages nécessaire multipliée par 2 ou 3 par rapport à une alimentation à volonté
- quantité de concentrés consommés identiques

INFLUENCE DU RATIONNEMENT SUR LES QUANTITÉS TOTALES CONSOMMÉES DE CONCENTRÉ POUR DES POIDS DE CARCASSES ÉQUIVALENTS (MOYENNE DE 22 ESSAIS)

Mode de distribution du concentré jusqu'à l'abattage	A volonté	Rationné
Quantités totales de concentré consommées par agneau après sevrage (kg brut)	53,5	51,0

Source : « Agneaux en bergerie, réussir la finition », 2018

- ✓ Fourrages : paille ou foin de graminées de 1ère coupe suffisant pour des agneaux avec du concentré

➔ à volonté et distribué tous les jours

- ✓ Accès au nourrisseur et à l'eau : avoir tout à disposition !

- Éviter la concurrence au nourrisseur : 12 agneaux au mètre pour les agneaux à volonté et 4 agneaux au mètre pour les agneaux rationnés (3 fois plus de place en rationné)
- 1 abreuvoir pour 50 agneaux
- Abreuvoir à 40 cm de haut




# ETAT D'ENGRAISSEMENT OPTIMUM

✓ Trier ses agneaux à partir de points de repère toutes les semaines

① Identification du sexe de l'agneau

« COUPE » TRANSVERSALE DE L'AGNEAU AU NIVEAU DES LOMBAIRES



② Palpation des apophyses épineuses et transverses

Source : CIIRPO - Idele



③ Estimation du gras autour de la queue



④ Couverture de gras des côtes



✓ Peser systématiquement les agneaux avant abattoir



Pesée



Estimation du poids carcasse

Un + par rapport au tri manuel

✓ Consulter le document « retour abattoir »

✓ Autre possibilité : Se rendre à l'abattoir pour faire le lien avec les agneaux notés en vif



Notation des carcasses en abattoir selon la grille EUROP

Source : CIIRPO - Idele