

Au fil des saisons

Cette lettre bimensuelle, adressée par mail à tous les membres du Ciirpo, vous informe des activités de recherche et de diffusion en cours au Mourier et sur les sites associés.

Situation climatique

TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en juin



36°C : T° maxi.

20°C : T° moyenne

8°C : T° mini.




83 mm : la pluviométrie

Grâce aux 40 mm de pluie d'orages de ces derniers jours, la pluviométrie du mois de juin dépasse les 80 mm. La température maximale a atteint les 36°C la semaine dernière.

Evolution des disponibilités en herbe

HAUTEUR D'HERBE (cm herbomètre) SUR LES SURFACES PATUREES



9 cm : moyenne au 21 juin

Les températures supérieures à 30°C de la mi-juin ont stoppé la pousse de l'herbe. Désormais, la biomasse disponible est équivalente à celles des deux années précédentes à la même date.

Les activités de la quinzaine

UNE AG SOUS LE SIGNE DU DYNAMISME

L'assemblée générale du CIIRPO a été l'occasion de faire le bilan sur l'année écoulée avec plus de 30 essais en suivi et des modes de diffusion renouvelés.



PLATEFORME DES FOURRAGES D'ETE

Les moha, millet, sorgho et teff grass semés pour la seconde année en plateforme d'essais au Mourier ont bien levé. Les premières notations ont été réalisées en début de semaine afin de mesurer les performances de levée.



AGNEAUX FINIS SUR LUZERNE ET PLANTAIN

Un nouvel essai avec des agneaux d'herbe sevrés vient de commencer au Mourier. Il s'agit de mesurer les intérêts d'un mélange de légumineuses (luzerne et trèfle violet) et de plantain par rapport à une prairie composée essentiellement de graminées.



Les nouvelles publications

LE REPLAY EST EN LIGNE

Le replay du premier volet de la réunion à distance du CIIRPO consacré aux leviers pour acheter moins d'aliment est en ligne.

➤ [à lire ici](#)



Type d'allotement	Economie
Retirer les brebis vides dès que les gestantes reçoivent du concentré	De 25 à 35 kg de concentré par brebis vide
Séparer les brebis simples et les doubles en fin en gestation	De 4 à 6 kg de concentré par brebis qui porte un agneau
Séparer les brebis simples et les doubles en lactation	De 20 à 25 kg de concentré par brebis qui allaite un seul agneau
Séparer les brebis en début et fin de lactation	De 5 à 10 kg de concentré par brebis en début de lactation

Les rendez-vous du CIIRPO

• Le 5 juillet

Les rencontres du CIIRPO pour les techniciens et les enseignants sur le site du Mourier. Pour vous inscrire : laurence.sagot@idele.fr

A voir ici

• Le 14 septembre

Les rencontres du CIIRPO pour les élèves sur le site du Mourier

• Le 15 septembre

Les rencontres du CIIRPO pour les éleveurs sur le site du Mourier