

**“Brebis et vaches pâturent
les mêmes prairies en alterné”**




➔ **RÉSULTATS PROVISOIRES DE L'ÉTUDE
CONDUITE À L'UNITÉ EXPÉRIMENTALE
HERBIPÔLE DE L'INRAE DE LAQUEUILLE (63)**

Pâturage alterné ovin-bovin

TROIS MOIS DE PÂTURAGE ALTERNÉ OVINS/BOVINS

Étude menée sur 2 ans (2024-2025)
pour définir les effets :

- Sur le parasitisme interne des deux espèces,
- Sur la qualité et la pousse de l'herbe.



LES MESURES RÉALISÉES

Mesures sur les animaux

En début et fin d'étude :

- Coproscopies,
- Coprocultures,
- Sérologies.

Tous les mois :

- Poids et état corporel,
- Coproscopies,
- Indice de diarrhée, propreté des flancs etc

Mesures sur les prairies

En début et fin d'étude :

- Relevés botaniques,
- Structure de végétation.


À chaque changement de parcelle :

- Hauteurs d'herbe en entrée et sortie de parcelle,
- Taux de refus,
- Quantité et qualité de l'herbe offerte.

COMPARAISON DE DEUX CONDUITES AU PRINTEMPS


SYSTÈME SPÉCIFIQUE (dit « système spé »)

Un lot de 36 brebis et 60 agneaux
sur 4 parcelles d'1 hectare en moyenne




SYSTÈME MIXTE


Un lot de 36 brebis et 60 agneaux + un lot de 9 génisses et 2 bœufs
sur 8 parcelles d'1 hectare en moyenne



Plus d'infos
en ligne




Partenaires
techniques :



Avec le soutien
financier de :



“Brebis et vaches pâturent les mêmes prairies en alterné”




RÉSULTATS PROVISOIRES DE L'ÉTUDE
CONDUITE À L'UNITÉ EXPÉRIMENTALE
HERBIPÔLE DE L'INRAE DE LAQUEUILLE (63)

Pâturage alterné ovin-bovin


PREMIERS RÉSULTATS DE LA COMPARAISON SUR LES ANIMAUX

1. SANS EFFET TRANCHÉ SUR L'EXCRÉTION EN STRONGLES DES BREBIS

Nombre d'œufs de strongles digestifs par g de crottes




2. UNE FORTE PROPORTION D'HAEMONCHUS CHEZ LES BREBIS




3. LE PÂTURAGE ALTERNÉ NE DISPENSE PAS D'UN TRAITEMENT DES AGNEAUX CONTRE LES STRONGLES DIGESTIFS

Nombre d'œufs de strongles digestifs par g de crottes



4. SANS EFFET SUR LA CROISSANCE DES AGNEAUX

Croissance des agneaux en g/jour




Source de l'ensemble des données : UE Herbipôle de l'INRAE de Laqueuille (63)

PREMIERS RÉSULTATS DE LA COMPARAISON SUR LES PRAIRIES


1. SANS AMÉLIORATION NOTABLE DE LA VALEUR ALIMENTAIRE DES PRAIRIES

Valeur énergétique en UFL par kg de matière sèche



2. UN TAUX DE REFUS À L'HERBE LÉGÈREMENT INFÉRIEUR AVEC LE PÂTURAGE ALTERNÉ

Taux de refus en %




LES ANALYSES EN COURS

- Coproscopies des bovins pour identifier les petite et grande douves.
- Composition floristique des prairies.
- Complémentarité de pâturage entre les 2 espèces.



LES RÉSULTATS DÉFINITIFS,
INCLUANT DES SUIVIS EN ÉLEVAGES,
SERONT DISPONIBLES EN JUIN 2026.

Partenaires techniques :



Avec le soutien financier de :

